

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLE PROTESI

Indicazioni

Al fine di evitare complicazioni nell'uso quali irritazioni oculari o infezioni, è necessario seguire attentamente le istruzioni qui riportate sul modo d'uso corretto, sulla manutenzione più appropriata e sulle più sicure regole igieniche da seguire ogni volta che le protesi sono manipolate e indossate.

Al fine di evitare problematiche alle cavità, impianti e bulbi è importante verificare l'assenza di controindicazioni dal medico oculista e **sottoporsi a controlli periodici.**

Avvertenze

Prima di maneggiare la protesi o sclerale si ricordi sempre di lavare e risciacquare accuratamente le mani.

Eviti che la cavità oculare o il bulbo e la protesi entri a contatto con dei cosmetici, lozioni, saponi, creme, deodoranti o spray, questi prodotti devono essere applicati prima della protesi.

La protesi deve essere applicata prima di truccarsi il viso e gli occhi.

Manutenzione

Nell'uso di protesi oculari va eseguito giornalmente il lavaggio della cavità orbitaria o della superficie bulbare, con soluzione fisiologica o con soluzione specifica raccomandata dallo specialista.

La procedura di pulizia e manutenzione di tali presidi prevede, ogni qualvolta vengano rimossi, l'uso di una soluzione detergente, successivamente deve essere lavata con acqua fredda e umettata con soluzione lubrificante prima di essere applicata.

È consigliabile pulire la protesi o sclerale ogni giorno con soluzione detergente e conseguente risciacquo.

L'uso pluri-giornaliero di un prodotto viscoelastico e umettante, prescritto dal medico oculista, ottimizza la tollerabilità ed il tempo d'uso della protesi oculare, riducendo gli inconvenienti da attrito palpebrale.

Le soluzioni enzimatiche e detergenti non devono mai andare a contatto con la cavità/bulbo oculare e si raccomanda di usare prodotti specifici per lenti a contatto rigide.

Precauzioni

Per quanto riguarda le **sclerali cosmetiche**:

Se dopo l'inserimento la sclerale risulta fastidiosa rimuoverla e risciacuarla: un corpo estraneo potrebbe essere sotto la sclerale.

È necessario rimuovere la sclerale, sospenderne l'uso e consultare lo specialista **immediatamente** in caso di arrossamenti, bruciori, sensazione di corpo estraneo, eccessiva lacrimazione e secrezione mucosa.

I farmaci diuretici, antistaminici, decongestionanti, tranquillanti possono provocare secchezza dell'occhio, in tal caso è necessario consultare il medico oculista.

Se una sostanza chimica viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e recarsi subito dall'oculista.